




Teadusnõukoja soovitused valitsusele 8. juunil 2021

Olukorra kirjeldus

Nakatamine on jõudsalt langenud ja epidemioloogiline olukord on 7. juuni seisuga jõudnud keskmise riski tasemele (kollane riskitase, vt täpsemalt kriis.ee). Nakatamiskordaja R on 7. juuni seisuga vahemikus 0,67-0,78. Nakatamine on võrreldes eelneva nädalaga vähenenud 30% ning seda pea kõikides vanuserühmades. Nakatamine on vanemate inimeste seas vähenenud kiiremini kui nooremate seas, siin mängib rolli ka eakate vanuserühmade kõrgem hõlmatus vaktsiiniga.








6. juuni seisuga on märkimisväärselt vähenenud ka nakatumise tase Ida-Virumaal ja Valgamaal, kuid mõnevõrra tõusnud Raplamaal.

Samuti on jätkuvalt vähenenud nii haiglaravi vajavate inimeste arv, uute haiglapatsientide arv kui ka surmade arv.

Viiruse positiivsete proovide geneetiline analüüs näitab, et Eestis domineerib 90% ulatuses UK ehk Alfa tüvi. LAV ehk Beeta tüve ei ole stabiilselt leitud. Siiski on mõnevõrra murettekitav, et India ehk Delta variant on alustanud Eestis siseriikliku levikut ja viimastel nädalatel on selle osakaal kiiresti kasvanud.

Prognos

Kui nakatumine püsib samasuguses langustrendis, jõuab praeguse prognoosi kohaselt nakatumine Eestis juuni viimases kolmandikus madala riski tasemele (st rohelisele tasemele).



Soovitused

Teadusnõukoda on seisukohal, et piirangute leevendamisega võib jätkata, kuid India tüvi-2 (Delta tüvi) kasvav levik vajab hoolikat monitoorimist.

Teadusnõukoda on seisukohal, et suvel tuleb jätkuvalt testida piiriületajaid, et vältida India tüvi-2 (Delta tüvi) levimist Eestis, jätkata vaksineerimisega (ennekõike suurendada hõlmatust eakate vanuserühmades) ning analüüsida olemasolevaid andmeid, et tagada parem ettevalmistus võimalikuks sügiseseks puhanguks. Vanuserühma 12-15 vaksineerimisega tuleks alustada, kui selleks kuluvad vaktsiinikogused ei vähenda vaktsiini kättesaadavust vanematele vanuserühmadele.